

	Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice IČO 47677406		1 z 1
		verze č.01	
		platnost od 01.01. 2016	

PROGRAM SCREENINGU (PREVENCE) KARCINOMU TLUSTÉHO STŘEVA

(viz Věstník MZ ČR z r. 2008)

Screeningem kolorektálního karcinomu se rozumí organizované, kontinuální vyhledávání a úsilí o včasný záchyt zhoubných nádorů nebo polypů konečníku a tlustého střeva. Provádí se vyšetřením stolice na okultní (skryté) krvácení ve stolici ve věku **50 - 54 let** v jednoročním intervalu. Od věku 55 let se asymptomatickým (bezpříznakovým) jedincům nabízí buď opakovaný test stolice ve dvouletém intervalu nebo jako alternativní metoda **primární screeningová kolonoskopie** (přímo bez testu), která může být v intervalu 10 let zopakována. V tomto případě se může pacient přímo obrátit na naše pracoviště (viz kontakty).

Test stolice (TOKS, nebo OK) se provádí v ordinaci praktického lékaře. Při pozitivním nálezu je potom indikována kolonoskopie na GE pracovišti.

Cílem screeningu je zvýšení včasnosti záchytu zhoubných nádorů a přednádorových lezí (tzv. pokročilého adenomu) a zvýšení podílu včasných stadií kolorektálního karcinomu na úkor pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti a incidence tohoto onemocnění.

Screening kolorektálního karcinomu se provádí u populace s běžným rizikem onemocnění nad 50 let. Vyloučení jsou pacienti s příznaky: např. krvácením z konečníku nebo pacienti s pozitivní rodinou anamnézou: např. příbuzní nemocných s karcinomem. U těchto jedinců doporučujeme provést kolonoskopii přímo (tedy bez TOKS)!

Další podrobnosti problematiky je možno konzultovat s naším pracovištěm.

MUDr. Tomáš Vích
prim. gastroenterologie
Nemocnice Hranice a.s.